Observation sur un abcez sinueux a la partie convexe du foye

Je fus apellé le 16. Octobre 1734. pour le S.r Flayol maitre Perruquier de cette ville, agé de 50 ans temperament melancolique et bilieux au sujet d'une tumeur abcedée a l'epigastre a la suite d'une tention dans le bas ventre qui avoit eté precedée par des anciennes obstructions biliaires au foye et une hemophtisie periodique depuis prés de dix ans qu'on avoit eu soin de tems en tems de traiter selon les indications. il y avoit environ 8. a 9. mois que ce malade avoit eté remis a l'usage des remedes desopstructifs et peu de tems aprés la tention du ventre ayant commencé a paroitre avec des douleurs sourdes a la region du foye, on y fit apliquer des fomentations et cataplames emolients et resolutifs; mais avec un peu trop de confiance jusqu'alors sans avoir recouru a la chirurgie pour s'assurer de la nature du mal et de l'operation convenable a son etat, car les progrés pouvoient cependant devenir tres funestes par l'epanchement des supurations qui se seroient peut etre fait jour dans la capacité du bas ventre, si les parens n'eussent demandé les secours de l'art; le malade etoit fort desseché et epuisé; il avoit la face d'un cadavre, le blanc de l'oeil et la peau d'une couleur verdatre, des frissons irreguliers, une fievre lente avec un poulx eteré,

ARC 48 n° 36
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la respiration genée, acompagnée d'une toux seche et frequente; le bas ventre etoit fort tendu principalement au coté droit des regions epigastrique et umbilicale; il y avoit une tumeur violette, platte, ovale, d'environ 9. ou 10. pouces de circonference qui s'etendoit en ligne droite depuis deux travers de doigt au dessous du cartilage xephoide, et des fausses cotes jusqu'a l'umbilic, ayant dans son milieu une petite elevation assés mole ou l'on reconnoissoit un vuide par le tact quand on pressoit toute la tumeur on sentoit un bruit comme dans l'amphiseme et elle diminuoit de volume parceque les matieres qu'elle contenoit paroissoient devoir rentrer alors sous la voute du diaphragme ou dans le vuide interne de l'abcés; cet examen fait, joint a l'ictericie qui avoit precedé ces derniers accidens fit juger que le principe de cette tumeur venoit des embarras du foye et comme elle parut avoir eté faite par conjection, je fus d'avis de l'ouvrir par le caustique dans la vüe de donner plus de cuite aux matieres et de jour a son issüe et sans perdre davantage un tems si precieux a ces indications, pour eviter le danger ou se trouvoit le malade depuis longtems, j'apliquay tout de suite une trainée de pierre a cautere de 4 doigts en long sur la pointe de la tumeur, qui etoit prés de la ligne blanche; deux heures apres ayant penetré de l'epaisseur d'un travers de doigt j'en ouvris l'escart d'un bout a l'autre avec la lancette, j'y remis encore

du caustique dans le fonds de l'incision pour aller
au foyer de la matiere, demy heure ensuite ayant
fait son effet, J'y arrivay en dissequant du coté
droit, pour m'éloigner des parties mitoyenes, il n'en sortit qu'une
demi palette d'un sang noir et dissout avec beaucoup
d'air tres infecte, Je mis les doigts dans le fond de
de l'abcés qui etoit tout celuleux jusques dans le
foye il en vint seulement a peu prés la moitié de
la coquille d'un oeuf de matiere jaune et blanche
bien liée, et ensuite assés de celle qui ressemble a de
la lie de vin, detrempée par des serosités et a la
faveur de ce conducteur j'agrandis la playe de bas
en haut vers les cotes avec le bistoury droit
respectant toujours comme je l'ay fait dans un autre
cas de cette nature, les brides interieures du coté de
l'angle inferieur formées par les adherences du
Kiste avec le peritoine, qui donna encore lieu a
l'issüe de quelques peu de matieres, ensorte que cette
ouverture avoit environ 4 doigts de longueur
exterieurement et se terminoit a deux doigts de long
en dedans; je reconnus que le foye etoit entamé a
sa partie convexe par les inegalités enfoncées de
sa substance, et que cette deperdition avoit prés
de 4 pouces et demy de circonference sur huit à dix
lignes d'enfoncement; mais il y a aparence que ce
n'etoit que le reservoir des matieres qui se formoient
de plus loin dans cette partie; il y avoit dans ce
fond bien des membranes ou chairs molasses pourries
et tres fetides, J'y reconnus aussy des fortes

adherences avec le peritoine, et le vuide de l'abcés ne
me parut pas si etendu entre la partie convexe du
foye et le peritoine, ou le diaphragme que je l'aurois
crus a cause des grandes tentions; toutes les parties
contenantes y etoient confondües sans pouvoir les
distinguer dans l'endroit operé. la playe fut pansée
avec un gros bourdonnet molet attaché, imbu —
d'esprit de vin mis dans le fond a cause de la —
pourriture, le reste avec de la charpy en confusion,
l'emplatre et l'apareil avec le bandage propre.
et il fut mis a un regime convenable.
Le 17. de ce mois 2. de l'operation le malade se —
trouva deja un peu soulagé des simptomes precedents.
mais la tention de l'epigastre ayant diminué, la region
umbilicale se trouva fort augmentée, et je craignis
dés lors que ce ne fut l'effet d'une matiere infiltrée,
ou epanchée jusques là, n'en etant presque point
sorti par la playe depuis l'ouverture de l'abcés,
j'y fis apliquer des fomentations emolientes et
resolutives, elle fut pansée avec une decoction
vulneraire fort animée avec la teinture de myrre
et d'aloës tirée par l'esprit de vin et l'egiptiac —
pour resister a la corruption.
Le 3.e la playe etoit encore plus gattée et tres fetide,
mais le 5.e elle commençoit a s'humecter et les tentions
exterieures diminuant peu a peu, j'aperceus que le
foye etoit dur, gros et plus etendu qu'il ne doit etre
a sa partie anterieure mais insensible au tact.
Le 6. le fond de la playe se detergeoit, les —

Supurations augmentoient et comme la fievre
diminuoit beaucoup on le mit a des Soupes
nourrissantes, ayant un extreme besoin de se reparer
et former par là un suc nourricier doux et
balzamique propre a bien alimenter la partie
alterée.

Le 8. le malade eut un grand accés de fievre precedé
d'un frisson d'une heure qui l'abatit beaucoup, sans
avoir rien changé a la playe.

Le 9. il etoit mieux, la playe se netoyoit toujours
assés bien, mais comme il sortit des matieres
sereuses d'un nouveau sinus qui venoit du coté du
diaphragme, je la dilatay encore d'un pouce
interieurement a son angle superieur, craignant
que le sejour des supurations n'eussent donné lieu a
cet accés de fievre.

Le 11. il etoit sans fievre, la playe paroissoit presque
toute detergée et garnie de bonne chair, je ne la
pansay plus qu'avec un vulneraire simple et il
fut mis aux aposemes aperitives martiales et
purgatives pour tacher d'enlever tout a fait les
obstructions du foye qui paroissoient un obstacle
a son entiere guerison.

Le 14. le 15. et 16. je trouvay l'apareil et la playe pale
et dilacerée, remplie de matiere sanguinolente comme
l'abie de vin a la suite de la separation des
membranes alterées qui etoient attachées au foye, des
escarres exterieures et de quelques petits accés de
fievre;

Le 24. tout etant dans un assés bon etat on suspendit
les remedes internes, et la playe ne fut plus pansée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qu'a plat, parcequ'elle paroissoit belle et disposée a la reünion, mais comme le foye n'étoit pas tout a fait reduit a sa grosseur naturele, et que les supurations qui varioient venoient toujours du fond; j'observay attentivement les mouvemens de la nature pour agir en consequence. vers le 31. l'evacuation des matieres ayant diminué, la tention du foye recommenca peu a peu avec douleur.

le 33. il survint encore un grand accés de fievre avec des coliques hepatiques et le lendemain la playe fu gatée par un fond de chair fongueuse, accompagné d'une abondante supuration qui me parurent etre les suites d'un reste du derangement de cette partie qui empechant la circulation, les filtrations et les distributions exactes des sucs, avoient donné lieu a des angorgemens, a des epanchemens et de la a des nouveaux abcés qui par un effet naturel s'etoient degorgées dans le meme reservoir pour leur donner une issüe, car j'y sentis avec le bout du doigt une molesse qui m'indiqua un vuide plus avant dans cette substance, je conduisis jusques la a la faveur de ce doigt sans l'avoir derangé une sonde a poitrine avec menagement qui penetra obliquement de bas en haut environ un pouce au dela dans l'epaisseur du foye, mais qui ne paroissoit pas avoir une grande circonference, il en sortit un peu de matieres liées et melangées avec du sang par la sonde dans le tems de l'inspiration, je jugeay alors que ce viscere pouvoit etre penetré de plusieurs autres sinus de cette nature, et sur le champ j'y adaptay le sifond d'une petite seringue pour

delayer la matiere et laver ce foyer fistaleux avec
une injection vulneraire et detersive, je pansay la
playe jusqu'au fond comme auparavant avec les memes
remedes exterieurs, aussi animés d'egiptiac dans la
vüe de fondre et deterger de cette partie les causes
locales, ensuite sans adition avec des dessicatives des
aluminauses simplement et selon les indications pour
redonner du ressort aux fibres charnües infiltrées et
relachées et produire par leurs unions une prompte
cicatrice; on le mit en meme tems a l'usage d'une opiate
aperitive febrifuge martiale, rendüe purgative
par intervale l'espace de 10. a 12. jours, la playe
devint plus belle, garnie de bonne chair ses levres
bordées d'une cicatrice enfoncée, les supurations
loüables et diminuées, la tention du foye s'etant
aussi presque toute abatüe peu a peu, il ne fut
plus question de fievre, le malade se trouva tout
a fait queri le 11. decembre suivant, et quelques
tems aprés bien reparé sans avoir eu la moindre
incomodité depuis lors. on jugera par cette
observation des effets favorables d'une nature forte et
vigoureuse, aidée a propos par les secours de l'art,
puisque les divers obstacles qui avoient donné lieu aux
pourritures et aux supurations, ~~heureusement~~
~~survenües dans cette ocasion~~, furent fondus et
suffisament detruits pour aplanir les routes de la
circulation et retablir par là les fonctions de ce viscere,
que tous les remedes internes les plus convenables
n'avoient pû imiter jusqu'alors. a marseille le 8. xbre 1738.

Boinnortier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Raporté par
ob. de m.r boismorié, M.r Caumont
Lüe à l'academie humeurs